

Spesielt aktuelle skadedyr for borettslag



Følgende arter vurderes som mest aktuelle:

- Brunrotte
- Småskogmus
- Skjeggkre
- Brun Pelsbille



Brunrotte


- Kalles normalt bare rotte i Norge.
- Kroppsvekt 200-500 gram for voksne rotter.
- Lengde snute-halespiss for voksne individer ligger vanligvis på 33-46 cm.
- Graver, svømmer og klatrer godt.
- Kommer i de fleste tilfeller fra kloakken, og tar seg inn i bygninger via avløpsrør, rørgjennomføringer og åpen grunn under bygningen.

Voksen brunrotte



Rotteunge

- Finnes i hele Norge, med tettest bestander i tett bebygde områder langs kysten.



Kart fra artsdatabanken.
Registrerte funn av
brunrotte i Norge.

Brunrottas utbredelse
gjenspeiler i stor grad
bosetningsmønsteret i
Norge. Stor overvekt i byer
langs kysten.


Småskogmus

- Vanligste mus innendørs i Sør-Norge.
- Kroppsvekt 8-28 gram
- Lengde fra snute til halespiss på voksne individer er 14-19cm.
- Store ører, og store, utstikkende øyne.



Småskogmus


- Vanlig nord til Trondheimsfjorden/Steinkjer.
- Kommer i de fleste tilfeller inn i bygg fra bakkeplan, via åpninger oppunder kledning/hjørnekasser, åpne ventiler, utette kjellerdører/kjellervinduer og utette garasjeporter.
- Kommer som oftest bare inn i bygninger høst og vinter.
- Store variasjoner i antall fra år til år



Skjeggkre

- Arten ble først registrert i Norge i 2013.
- Skjeggkre er et vingeløst insekt.
- Hovedsakelig nattaktiv.
- Av utseende likt sølvkre, men blir større og er mer hårete med lengre antenner og haletråder
- Voksne individer har en kroppslengde på 10-18 mm.
- Kan leve av både vegetabilsk og animalsk føde. Lever først og fremst av støv.
- Trenger minimalt med næring, og kan klare seg i flere måneder uten mat.





- Tiden fra nyklekket individ til voksent, kjønnsmodent individ tar mellom 1,5 og 3 år.
- Etter kjønnsmodning kan skjeggkreet leve i ytterligere 3-4 år.
- Skjeggkrehunnen legger i gjennomsnitt 56 egg i året, dvs. ca ett egg i uka.
- Skjeggkre trives best i fuktige miljøer, men spesielt de voksne individene klarer seg også bra i tørrere miljøer en viss tid.
- Skjeggkre spres med varer inn i bygg.
- Skjeggkre lar seg normalt lett sanere med åte, hvis man får tilgang til hele bygningsmassen.

Brun Pelsbille

- Brun pelsbille ble først registrert i Norge i 1983. Dette var på Majorstua i Oslo.
- Fortsatt er hoved utbredelsen i Oslo-området, men er registrert i alle deler av landet.
- Lever 4-12 måneder som larve, før den utvikler seg til en voksen bille.
- De voksne billene parrer seg og hunnene legger egg, før de alle så dør før det har gått 3 uker.
- Brun pelsbille lever av næringspartikler av både animalsk og vegetabilsk opprinnelse.
- Typisk næring i norske boliger er hud og håravfall fra mennesker og husdyr, samt matrester (vanlig husstøv).
- Fjernes/holdes i sjakk med grundig renhold i de fleste tilfeller.
- Kan være en utfordring i boliger med gamle tregulv med mye sprekker.



Takk for meg!

